

Facteurs de risque professionnel pour les infections

Les agents qui peuvent entraîner des infections comprennent les suivants :

| | Quels sont les professionnels de la santé à risque ? | Y a-t-il d'autres professions à risque ? |
|---|--|--|
| Aérogène, viral | | |
| Varicelle | Tous | |
| Rougeole | Médecins et personnel infirmier | |
| Rubéole | Tous | |
| Oreillons | Pédiatres et dentistes | |
| Coqueluche | Tous | |
| Infection au parvovirus B19 | Personnel infirmier | |
| Infection au virus respiratoire syncytial (RSV) | Tous | |
| Infection à l'adénovirus | Personnel des cliniques ophtalmologiques, des unités de soins intensifs et des soins pédiatriques de longue durée | |
| Grippe | Médecins et personnel infirmier | Employés de bureau |
| SRAS-coronavirus A | Médecins, personnel infirmier, assistants en soins de la santé et autres ; aides-soignants ; personnel d'entretien ménager, personnel de laboratoire | Ouvriers des transports, voyageurs d'affaires, marché pour animaux exotiques |
| Grippe aviaire H5N1 | Médecins, personnel infirmier, assistants en soins de la santé | Ouvriers de volaille, des exploitations agricoles et marchés |
| Infection à Mycoplasmes | Tous | |
| Aérogène, bactérien | | |
| Tuberculose | Personnel infirmier, médecins, pathologistes, personnel de laboratoire, personnel d'entretien | |
| Anthrax | Personnel hospitalier | Travailleurs agricoles, trieurs de laine, trieurs de courrier |
| Psittacose | | Traitement de dindes |

| Virus à diffusion hématogène | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Infection par le VIH | Médecins, personnel infirmier, travailleurs dentaires et dentistes, personnel de laboratoire, techniciens en unité de dialyse, thérapeutes respiratoires | Embaumeurs ou techniciens de morgue |
| Infection à Ebola | Personnel infirmier | |