

Czynniki ryzyka zawodowego związane z ostrymi urazami inhalacyjnymi

Czynniki, które mogą powodować ostre urazy inhalacyjne, to między innymi:

Drażniące gazy	Organiczne substancje chemiczne	Metaliczne związki chemiczne	Mieszaniny złożone
Wysoka rozpuszczalność w wodzie, np. amoniak, dwutlenek siarki, chlorowodór	Kwasy organiczne, np. kwas octowy	Opary rtęci	Dymy pożarowe
Umiarkowana rozpuszczalność w wodzie, np. chlor, siarkowodór	Aldehydy, np. formaldehyd, akroleina	Tlenki metali, np. kadmu, wanadu, manganu, osmu	Produkty pirolizy tworzyw sztucznych
Niska rozpuszczalność w wodzie, np. ozon, dwutlenek azotu, fosgen	Izocyjaniany	Halogenki, np. chlorek cynku, czterochlorek tytanu, pięciochlorek antymonu, sześćfluorek uranu	Mieszaniny rozpuszczalników
	Aminy, np. hydrazyna, chloraminy	Tetrakarbonyl niklu	Zarodniki i toksyny pochodzące od mikroorganizmów
	Gaz łzawiący (CS), gaz musztardowy	Wodorki boru, litu, arsenu, antymonu	(Opary polimerów)
	Rozpuszczalniki organiczne, w tym niektóre spraye do skóry	(Opary metali)	
	Niektóre środki agrochemiczne (parakwat, inhibitory cholinesterazy)		