

Профессиональные факторы риска рака легких

К факторам, которые могут привести к раку легких, относится следующее:

Агенты с достаточными доказательствами связи с раком легких	Агенты с ограниченными доказательствами связи с раком легких
Производство алюминия	Художественное стекло, стеклотара и прессованные изделия (производство)
Мышьяк и неорганические соединения мышьяка	Биомассовое топливо (в основном древесина), выбросы в атмосферу от сжигания в домашних хозяйствах
Асбест (все формы)	Производство угольных электродов
Бериллий и соединения бериллия	Альфа-хлорированные толуолы и бензоилхлорид (комбинированное воздействие)
бис(хлорметил)эфир	Металлический кобальт с карбидом вольфрама
Хлорметилметилэфир (технический)	Креозоты
Кадмий и соединения кадмия	Выхлоп двигателя, дизель
Соединения хрома (VI)	Жарка, выбросы от высокой температуры
Уголь, выбросы в атмосферу от сжигания в домашних хозяйствах	Инсектициды, не содержащие мышьяк (профессиональное воздействие при распылении и применении)
Газификация угля	Процессы печати
Каменноугольный пек	2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин
Производство кокса	Сварочный дым
Добыча гематита (подземная)	
Литье чугуна и стали	
МОРР (смесь винкристина-преднизолона-азотистого иприта-прокарбазина)	
Соединения никеля	
Покраска	
Плутоний	
Радон-222 и продукты его распада	
Резиновая промышленность	
Пыль кремнезема, кристаллического	
Сажа	
Иприт сернистый	
Табачный дым, пассивное курение	
Курение табака	
Рентгеновское излучение, гамма-излучение, кислотные туманы, сильные неорганические	