

Fattori di rischio occupazionali per il cancro del polmone

Gli agenti che possono provocare il cancro del polmone:

Agenti con prove sufficienti di legame con il cancro del polmone	Agenti con prove limitate di legame con il cancro del polmone
Produzione di alluminio	Vetro artistico, contenitori di vetro e articoli pressati (produzione)
Arsenico e composti inorganici dell'arsenico	Combustibile da biomassa (principalmente legno), emissioni interne derivanti dalla combustione domestica
Amianto (tutte le forme)	Produzione di elettrodi in carbone
Berillio e composti del berillio	Tolueni alfa-clorurati e cloruro di benzoile (esposizioni combinate)
bis(clorometil)etere	Metallo cobalto con carburo di tungsteno
Clorometilmetiletere (grado tecnico)	Creosoti
Cadmio e composti del cadmio	Scarico motore, diesel
Composti del cromo (VI)	Frittura, emissioni da alta temperatura
Carbone, emissioni interne da combustione domestica	Insetticidi, non arsenicali (esposizioni occupazionali nell'irrorazione e nell'applicazione)
Gassificazione del carbone	Processi di stampa
Pece di catrame di carbone	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-diossina
Produzione di coke	Fumi di saldatura
Estrazione di ematite (sotterranea)	
Fonderia di ferro e acciaio	
MOPP (miscela vincristina-prednisone-iprite di azoto-procarbазina)	
Composti del nichel	
Pittura	
Plutonio	
Radon-222 e relativi prodotti di decadimento	
Industria della produzione di gomma	
Polvere di silice cristallina	
Fuliggine	
Iprite di zolfo	
Fumo di tabacco passivo	
Fumo di tabacco	
Raggi X, raggi gamma nebbie acide, inorganiche forti	